FLORAL 20 20 20

Azote (N) 20% dont 5.5% nitrique, 8% ammoniacal et 6.5 % uréique, Anhydride phosphorique 20%, , Oxyde de Potassium 20% , Bore 0.05%, Cuivre chélaté EDTA 0.01%, Fer chélaté DTPA 0.2%, Manganèse chélaté EDTA 0.1%, Molybdène 0.005%, Zinc chélaté EDTA 0.01%.

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : CIFOUMIC 10 10 10
- **Classe du produit** : Fertilisant NPK 20-20-20 + Oligo-élémets pour une meilleure production
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : 1225/DCPT/SPV/BPH/SI
- **Type de formulation** : Poudre
- **Composition chimique** : Azote (N) 20% dont 5.5% nitrique, 8% ammoniacal et 6.5 % uréique, Anhydride phosphorique 20%, , Oxyde de Potassium 20% , Bore 0.05%, Cuivre chélaté EDTA 0.01%, Fer chélaté DTPA 0.2%, Manganèse chélaté EDTA 0.1%, Molybdène 0.005%, Zinc chélaté EDTA 0.01%.
- **Mode d'action** : FLORAL 20-20-20 : Engrais indispensable pour les plantes. C'est une formulation à absorption par voie foliaire à fort pouvoir d'assimilation caractérisée par un parfait équilibre de macroéléments et par la présence de micro-éléments essentiels pour la plante.
  FLORAL 20-20-20 : caractérisé par une forte pureté de ses composants aussi par une très basse salinité et d'une dissolution complète du produit.
  FLORAL 20-20-20 : comporte dans sa formulation des adjuvant caractérisé par une s innovants (substances adhésives et véhiculantes) qui améliorent l'absorption foliaire et permettent une translocation rapide des éléments nutritifs.
  FLORAL 20-20-20 : Comporte des micro-éléments chélatés pour assurer une prévention complète des carences les plus connues.

Efficacité

Culture	Dose (g/hl)
Vigne	250-300
Pêcher, Prunier, Abricotier, Cerisier	250-300
Poirier, Pommier	250-300
Agrumes	300-400
Olivier	250-300
Fraisier	200-250
Plantes potagères	250-300
Cultures industrielles	4-5 Kg/ha
Céréales	4-5 Kg/ha
Plantes fourragères	4-5 Kg/ha
Plantes ornementales à fleurs, Pépinières	250-300

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi** : FLORAL 20-20-20 est recommandée pour une pulvérisation foliaire.
- **Période d'emploi** :
  Sur Vigne : A partir de la floraison jusqu'un mois de la récolte,
  Sur Pêcher, Prunier, Abricotier et Cerisier : Après la phase de la chute des pétales,
  Sur Poirier et pommier : Nouaison et grossissement des fruits,
  Sur Agrumes : durant tout le cycle de la culture,
  Sur Olivier : Nouaison et durcissement du noyau,
  Sur Fraisier : 2 à 3 interventions après floraison à 12-15 jours d'intervalle,
  Sur plantes potagères : A partir des premières phases de végétation jusqu'à la récolte,
  Sur cultures industrielles : Lors des premières phases de végétation (20 jours après l'émergence),
  Sur Céréales : En fin de tallage-début de la levée
  Sur plantes fourragères : Après fauchage,
  Sur plantes ornementales : Lorsque les plantes sont en pleine végétation.
- **Conditionnement : 2,5 Kg.**